

IZOLACIJA OBOJELI

7 DANA¹

- PREBOLJELI
- PRIMARNO CIJEPLJENI/DOCIJEPLJENI

↓

OSOBE S BLAGOM DO UMJERENOM KLINIČKOM SLIKOM KOJI NISU IMUNOKOMPROMITIRANI

10 DANA

- OSOBE KOJE NISU PREBOLJELE TE NISU CIJEPLJENE

20 DANA

- TEŽI OBLIK BOLESTI KOJI ZAHTJEVA INTENZIVNO LIJEČENJE

SAMOIZOLACIJA KONTAKTI

NE TREBA SI > 18 GOD

- PREBOLJELI UNUTAR 4 MJESECA (120 DANA)
- PRIMARNO CIJEPLJENI (2 DOZE) UNUTAR 4 MJESECA (120 DANA), TJ. UNUTAR 2 MJESECA (60 DANA) UKOLIKO SE RADI O JANSSENU
- DOCIJEPLJENI (BOOSTER DOZA)
- PREBOLJENJE + PRIMARNO CIJEPLJENI
- PREBOLJENJE + 1 DOZA CJEPIVA UNUTAR 4 MJESECA

NE TREBA SI < 18 GOD

- PREBOLJELI UNUTAR 4 MJESECA (120 DANA)
- PRIMARNO CIJEPLJENI (BEZ VREMENSKOG OGRANIČENJA)
- PREBOLJELI + 1 DOZA CJEPIVA (BEZ VREMENSKOG OGRANIČENJA)

7 DANA²

- PREBOLJELI PRIJE VIŠE OD 4 MJESECA (120 DANA)
- PRIMARNO CIJEPLJENI (2 DOZE) PRIJE VIŠE OD 4 MJESECA (120 DANA), TJ. VIŠE OD 2 MJESECA (60 DANA) UKOLIKO SE RADI O JANSSENU

10 DANA

- OSOBE KOJE NISU PREBOLJELE TE NISU CIJEPLJENE

¹ NAGLASITI DA JE PO ISTEKU 7 DAN POTREBNO STROGO PRIDRŽAVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA/POJAČANI NADZOR NAREDNA 3 DANA

² ZDRAVSTVENI DJELATNICI I DJELATNICI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI TREBAJU SE TESTIRATI PRIJE POVRATKA NA POSAO BRZIM ANTIGENSKIM TESTOM ILI PCR-OM